



Informe
06

Dinámica de emergencia de
Rhyssomatus subtilis

› Sección Zoología Agrícola

Campaña **2025 | 2026**

Distribución de las jaulas de emergencia de *Rhyssomatus subtilis*




Figura 1. Localidades consideradas en los relevamientos de la emergencia de los adultos de *Rhyssomatus subtilis* desde el suelo. Campaña 2025/2026.

El color corresponde al porcentaje de adultos de *Rhyssomatus subtilis* emergidos desde el suelo con respecto al número determinado en los monitoreos de suelo.

| Color | Porcentaje de picudos emergidos | Nivel de emergencia |
|-------|---------------------------------|---------------------|
| ■ | 0% a 5% | Nulo/Bajo |
| ■ | 6% a 10% | Moderado |
| ■ | > 10% | Alto |

Comentarios

Entre el 10 y el 18 de febrero se registró emergencia de adultos de *R. subtilis* desde el suelo en todas las localidades relevadas, producto de las precipitaciones que ocurrieron en este período. Los valores de emergencia fluctuaron fueron altos en las localidades de San Agustín, Burruyacu y La Cocha.

Se recomienda intensificar monitoreos en lotes de soja, sobre todo en aquellas situaciones de monocultivo, dado que se está por ingresar a las fases más críticas al daño ocasionado por este picudo (R5 en adelante). Prestar especial atención a las borduras de lotes de soja que limitan con gramíneas (maíz/sorgo), por la migración de los picudos que emergen de estos lotes. En aquellos lotes que se encuentran en etapas reproductivas iniciales (R2/R3) es aconsejable disminuir los niveles poblacionales de la plaga antes del ingreso a las fases correspondiente al llenado de granos (R5).

Lotes con poroto recién implantado y que tienen como antecesor la soja, se debe tener en cuenta que el cultivo de poroto puede verse afectado de manera significativa por los daños ocasionados por este picudo en estas fases iniciales. El tratamiento de semillas con neonicotinoides permite un control efectivo de este picudo en etapas iniciales del poroto, debiéndose monitorear al cultivo para determinar el momento donde esta herramienta comienza a perder efectividad.

Parámetros evaluados

- **Número de adultos en suelo** expresados como número de picudos/m², a partir del monitoreo de suelo, previo a la colocación de las jaulas de emergencia.
- **Emergencia de picudos** este parámetro se expresa como número de picudos emergidos/m².
- **Porcentaje de emergencia** se calcula a partir del valor de picudos emergidos/m² en cada monitoreo, con respecto al total de picudos/m² determinado en el monitoreo de suelo.
- **Precipitaciones (mm) y número de días con lluvias.**
- **Porcentaje de hembras emergidas** (San Agustín).

Dinámica de emergencia de *Rhyssomatus subtilis* según localidad

1) San Agustín, departamento Cruz Alta, Tucumán.

Fecha de colocación de jaulas: **8 de enero de 2026**.

Número de adultos de *R. subtilis* en monitoreo de suelo: **56,0 picudos/m²**.

Tabla 1. Número de adultos de *Rhyssomatus subtilis* emergidos/m² y porcentaje de emergencia con respecto al valor determinado en el monitoreo de suelo. Se detallan el porcentaje de hembras emergidas, las precipitaciones (mm) y el número de días con lluvia según período de muestreo. San Agustín.

| Período | Nº picudos emergidos/m ² | Porcentaje de emergencia | Hembras (%) | Lluvias (mm) | Nº días con lluvia |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 9 al 13 ene | 1,0 | 1,8% | 50,0 | 28,7 | 2 |
| 14 al 20 ene | 15,0 | 26,8% | 33,3 | 129,3 | 6 |
| 21 al 26 ene | 9,0 | 16,1% | 33,3 | 22,9 | 3 |
| 27ene al 2 feb | 13 | 23,2% | 42,3 | 39,1 | 4 |
| 3 al 9 feb | 4,0 | 7,1% | 50,0 | 7,4 | 3 |
| 10 al 18 feb | 6,0 | 10,7% | 58,3 | 18,3 | 7 |

2) Burruyacu (Estancia El Azul), departamento Burruyacú, Tucumán.

Fecha de colocación de jaulas: **7 de enero de 2026**.

Número de *R. subtilis* en monitoreo de suelo: **72,0 picudos/m²**.

Tabla 2. Número de adultos de *Rhyssomatus subtilis* emergidos/m² y porcentaje de emergencia con respecto al valor determinado en el monitoreo de suelo. Se detallan las precipitaciones (mm) y el número de días con lluvia según período de muestreo. Burruyacu (Estancia El Azul).

| Período | Nº picudos emergidos/m ² | Porcentaje de emergencia | Lluvias (mm) | Nº días con lluvia |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 8 al 13 ene | 1,0 | 1,4% | 38 | 3 |
| 14 al 20 ene | 6,5 | 9% | 115,9 | 6 |
| 21 al 27 ene | 19,5 | 27,1% | 74,9 | 2 |
| 28 ene al 3 feb | 28,0 | 41,7% | 8,6 | 1 |
| 4 al 10 feb | 21,0 | 29,2% | 18,3 | 2 |
| 11 al 17 feb | 19,0 | 26,4% | 8,9 | 1 |

3) La Cocha, departamento La Cocha, Tucumán.

Fecha de colocación de jaulas: **12 de enero de 2026**.

Número de adultos de *R. subtilis* en monitoreo de suelo: **55,2 picudos/m²**.

Tabla 3. Número de adultos de *Rhyssomatus subtilis* emergidos/m² y porcentaje de emergencia con respecto al valor determinado en el monitoreo de suelo. Se detallan las precipitaciones (mm) y el número de días con lluvia según período de muestreo. La Cocha.

| Período | Nº picudos emergidos/m ² | Porcentaje de emergencia | Lluvias (mm) | Nº días con lluvia |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 12 al 22 ene | 4,8 | 8,7% | 113,3 | 9 |
| 23 al 26 ene | 5,1 | 9,2% | 79,3 | 2 |
| 27 ene al 2 feb | 8,0 | 14,5% | 45,2 | 3 |
| 3 al 10 feb | 5,7 | 10,3% | 17,5 | 3 |
| 11 al 16 feb | 8,6 | 15,6% | 21,8 | 3 |

4) Isca Yacu (Javicho), departamento Jiménez, Santiago del Estero.Fecha de colocación de jaulas: **13 de enero de 2026.**Número de adultos de *R. subtilis* en monitoreo de suelo: **96,0 picudos/m².**

Tabla 4. Número de adultos de *Rhyssomatus subtilis* emergidos/m² y porcentaje de emergencia con respecto al valor determinado en el monitoreo de suelo. Se detallan las precipitaciones (mm) y el número de días con lluvia según período de muestreo. Isca Yacu (Javicho).

| Período | Nº picudos emergidos/m ² | Porcentaje de emergencia | Lluvias (mm) | Nº días con lluvia |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 13 al 19 ene | 3,0 | 3,1% | 64,3 | 5 |
| 20 al 27 ene | 7,5 | 7,8 % | 11,7 | 4 |
| 28 ene al 4 feb | 4,5 | 4,7% | 1 | 2 |
| 5 al 9 feb | 8,0 | 8,3% | 0,0 | 0 |

5) El Charco, departamento Jiménez, Santiago del Estero.Fecha de colocación de jaulas: **15 de enero de 2026.**Número de adultos de *R. subtilis* en monitoreo de suelo: **117,6 picudos/m².**

Tabla 5. Número de adultos de *Rhyssomatus subtilis* emergidos/m² y porcentaje de emergencia con respecto al valor determinado en el monitoreo de suelo. Se detallan las precipitaciones (mm) y el número de días con lluvia según período de muestreo. El Charco.

| Período | Nº picudos emergidos/m ² | Porcentaje de emergencia | Lluvias (mm) | Nº días con lluvia |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 15 al 20 ene | 2,0 | 1,7 % | 120,7 | 5 |
| 21 al 26 ene | 0,5 | 0,4 % | 20,8 | 3 |
| 27 ene al 2 feb | 4,0 | 3,4 % | 56,1 | 3 |
| 3 al 9 feb | 4,0 | 3,4 % | 18,3 | 1 |
| 10 al 16 feb | 5,0 | 4,3 % | 29,2 | 2 |

6) Antilla, departamento Rosario de la Frontera, Salta.Fecha de colocación de jaulas: **7 de enero de 2026.**Número de *R. subtilis* en monitoreo de suelo: **48,8 picudos/m².**

Tabla 6. Número de adultos de *Rhyssomatus subtilis* emergidos/m² y porcentaje de emergencia con respecto al valor determinado en el monitoreo de suelo. Se detallan las precipitaciones (mm) y el número de días con lluvia según período de muestreo. Antilla).

| Período | Nº picudos emergidos/m ² | Porcentaje de emergencia | Lluvias (mm) | Nº días con lluvia |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 8 al 13 ene | 0,0 | 0,0% | 38 | 2 |
| 15 al 20 ene | 3,0 | 6,1% | 78 | 4 |
| 21 al 27 ene | 3,0 | 6,1% | 127 | 2 |
| 28 ene al 3 feb | 3,0 | 6,1% | 12 | 1 |
| 4 al 10 feb | 0,0 | 0,0% | 14 | 2 |
| 11 al 18 feb | 1,5 | 3,1% | 50 | 2 |