



ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 23 al 27 de febrero de 2026.

Mancha marrón

(*Septoria glycines*)

Localidades	Est. Fenológico	Inc. (%)	Altura (%)
La Cocha, Tucumán	R 4	100	20
Leales, Tucumán	R 3	100	20
San Agustín, Cruz Alta, Tucumán	R 3	100	20
Los Pereyra, Cruz Alta, Tucumán	R 4	100	20



Identificación

Manchas irregulares marrón oscura con bordes indefinidos.

Amarillamiento generalizado en las hojas.





ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 23 al 27 de febrero de 2026.

Mancha ojo de rana

(*Cercospora soja*)

Localidades	Est. Fenológico	Inc. (%)	Sev. (%)
La Cocha, Tucumán	R 4	60	10
Leales, Tucumán	R 3	70	15
San Agustín, Cruz Alta, Tucumán	R 3	5	3

Identificación

Manchas angulares o circulares de color castaño rojizo cuyo centro se torna castaño más claro.

Las manchas no tienen halo clorótico.

***Importante: para confirmar la presencia del patógeno es necesario observar las muestras en el laboratorio.**





ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 23 al 27 de febrero de 2026.

Mancha anillada

(*Corynespora cassiicola*)

Localidades	Est. Fenológico	Inc. (%)	Sev. (%)
La Cocha, Tucumán	R 4	30	7
San Agustín, Cruz Alta, Tucumán	R 3	60	10
Los Pereyra, Cruz Alta, Tucumán	R 4	80	15

Identificación

Lesiones con anillos concéntricos de tejido muerto rodeado por un halo amarillento.





ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 23 al 27 de febrero de 2026.

Para tener en cuenta:

Tizón de la hoja por *Cercospora* (*Cercospora kikuchii*, *Cercospora* spp.)

Localidades

Villa Padre Monti, Burruyacú, Tucumán

Est. Fenológico

R 5

Identificación

El tizón se caracteriza por tejido necrótico y coloración púrpura (Figura 1). Debido a estos síntomas, tradicionalmente se ha conocido la enfermedad como tizón morado de la soja. Sin embargo, Sautua (2021) en Argentina, observó la presencia de *Cercospora* spp. en hojas con lesiones aisladas, con y sin halo clorótico, sintomatología similares a la mancha marrón de la soja (*Septoria glycines*), pero localizada en el tercio superior del canopeo.

De las lesiones observadas en la Figura 2 se confirmó la presencia de conidios y conidióforos típicos de *Cercospora* spp. (Figura 3).



Figura 1



Figura 2




Figura 3

Conidios

Conidióforos

Equipo de trabajo

Dr. Sebastian Reznikov
Dra. Juliana Bleckwedel
Mg. Catalina Aguaysol
Tec. R. Exequiel Nieva