



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 50


16 de septiembre de 2026



AAPPCE



Aapresid



16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

INFORME N°50

1 de septiembre al 15 de septiembre de 2026

En este quincuagésimo informe se relevaron en total 327 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (49 localidades), NEA (68 localidades), Litoral (38 localidades), Centro Norte (65 localidades) y Centro Sur (107 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 5 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de líneas para comparar los valores de captura de los meses de julio, agosto y septiembre (1° quincena) de 2025 con los de iguales periodos del 2026.

En la región NOA se evidenció una fuerte retracción poblacional de *D. maidis*, con una marcada disminución de las localidades con >100 adultos por trampa, que representó el 2% (1 localidad), como se detalla en la Figura 3. Las poblaciones de esta región se desplazaron hacia niveles de menor abundancia, predominando actualmente las categorías de 1 a 4 adultos por trampa (27%) y de 5 a 20 individuos (47%), confirmando una clara tendencia de descenso regional del vector (Figura 3).

En la región NEA se profundizó la retracción poblacional de *D. maidis*, con capturas del vector en un 54% de las localidades (Figura 5). En estas localidades predominaron las categorías de 1 a 4 adultos por trampa (37%) y de 5 a 20 individuos (12%), como se detalla en la Figura 5.

En la región Litoral se consolidó la retracción poblacional de *D. maidis*, con un 84% de las localidades con ausencia del vector (Figura 7). Asimismo, en localidades que presentaron capturas, predominó la categoría de 1 a 4 adultos por trampa (10%), confirmando un escenario regional caracterizado por muy baja abundancia del vector (Figura 7).

En el Centro Norte se registró una marcada reducción de los niveles poblacionales de *D. maidis*, donde las localidades con ausencia del vector aumentaron de un 38% al 63% en este último informe (Figura 9). Las localidades con captura del vector solamente estuvieron representadas por las categorías de 1 a 4 adultos por trampa (23%) y de 5 a 20 individuos (14%), como se detalla en la Figura 9.

En el Centro Sur, en el 99% de las localidades no se registró a *D. maidis*, consolidando a esta región como la de menor presencia del vector (Figura 11).

En todas las regiones se continúa observando una retracción poblacional de *D. maidis* durante la primera quincena de septiembre del 2026, con una disminución marcada de las categorías de mayor abundancia y un desplazamiento hacia niveles de captura bajos o de ausencia del vector (Figuras 1 y 2). El NOA y NEA (áreas endémicas) y Centro Norte (área de transición) son las regiones que tuvieron mayores abundancias, observándose en el NOA y Centro-Norte, valores ligeramente superiores a los registrados en igual periodo del 2025. En contraste, en el Litoral y Centro-Sur la retracción se profundizó, configurando un escenario de muy baja abundancia, con una elevada proporción de localidades donde no se detectó el vector, similar a lo observado durante el mismo período de 2025.

Bajo este escenario, resulta clave mantener un monitoreo activo y sistemático de *Dalbulus maidis*, considerando dos aspectos fundamentales:

- ✓ **Manejo de maíces voluntarios:** constituye un punto clave y prioritario, para interrumpir la continuidad del “puente verde”, evitando de esta forma la supervivencia y el mantenimiento del vector y del complejo de patógenos asociados al achaparramiento entre campañas.
- ✓ **Monitoreo de chicharrita en lotes con maíz de primera:** el monitoreo frecuente, desde la emergencia del cultivo, permitirá detectar tempranamente la presencia del vector. En estos maíces, las condiciones ambientales iniciales, suelen ser menos favorables para el desarrollo de la plaga, con una evolución más lenta de sus poblaciones. Este aspecto puede ofrecer ventajas a la hora de definir la adopción de alguna estrategias de manejo, basada en el monitoreo y detección del vector, con el objeto de minimizar su evolución y futuros daños sobre los maíces de primera y/o las siembras tardías de este cultivo.

Además, las condiciones ambientales durante la transición invierno-primavera, como amplitud térmica y la eventual ocurrencia de heladas tardías, podría contribuir a profundizar la retracción poblacional observada.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control

diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 50ª lectura (01/09 al 15/09).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el vigésimo quinto al cuadragésimo noveno informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° (01/09 al 15/09).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 47 localidades, donde el **88%** registraron presencia del vector (**Figura 3**). Las categorías comprendidas entre los niveles de 1 a 20 adultos por trampa, fueron las más frecuentes, representando el **74%** de las localidades relevadas en este monitoreo (**Figura 3**). Se observó una marcada retracción de la máxima categoría (> 100 adultos por trampa), respecto del relevamiento anterior, siendo **Huasa Pampa (Tucumán)** la única localidad incluida en esta categoría, con un valor **401 adultos por trampa** (**Figura 3 y Tabla Región NOA**).

Durante la primera quincena de septiembre de 2026 se continuó profundizando la retracción poblacional de *D. maidis*, con capturas que descendieron de **51,52 adultos/trampa** (2° quincena de agosto) a **18,15 adultos/trampa** (1° quincena de septiembre). A pesar de esta reducción, por encima del 60%, los valores se mantuvieron superiores a los registrados en iguales periodos del 2025 (**Figura 4**).




Figura 4. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NOA, correspondiente a los meses de julio, agosto y a la primera quincena de septiembre de 2025 y 2026.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° (01/09 al 15/09).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región NEA

Del relevamiento realizado en 68 localidades, en un **54%** se detectó la presencia de *D. maidis* (**Figura 5**). Las categorías más frecuentes fueron las comprendidas entre los niveles de 1 a 20 adultos por trampa, representando el **49%** de las localidades relevadas en este monitoreo (**Figura 5**). Las mayores abundancias se concentraron en **Comandante Fontana** (Formosa), con un valor **119 adultos por trampa**, seguidas por **Pampa del Infierno** (Chaco), con registros cercanos a los **45 individuos por trampa** (**Figura 5 y Tabla Región NEA**).

Durante la primera quincena de septiembre de 2026 se profundizó la retracción poblacional de *D. maidis*, con capturas que descendieron de **20,17 adultos/trampa** (2° quincena de agosto) a **5,24 adultos/trampa** (1° quincena de septiembre). En esta región los niveles de captura se redujeron en un 70% aproximadamente, alcanzando valores semejantes a los registrados en el 2025. (**Figura 6**).




Figura 6. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NEA, correspondiente a los meses de julio, agosto y a la primera quincena de septiembre de 2025 y 2026.

Resumen Región Litoral




Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° (01/09 al 15/09).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 38 localidades, con incrementos de la categoría correspondiente a la ausencia del vector (**84%**), como se detalla en la Figura 7. En las localidades donde hubo capturas de *D. maidis*, la categoría predominante fue la de baja abundancia (1 a 4 adultos por trampa), que representó el **10%** (Figura 7). En esta región, la localidad de **Montecarlo (Misiones)**, incorporada recientemente en la **Red Nacional de Monitoreo**, presentó el mayor nivel de captura, con **67 adultos por trampa**, aunque se evidenció una reducción de su número con respecto al monitoreo anterior (**Figura 7 y Tabla Región Litoral**).

Durante la primera quincena de septiembre de 2026 el valor promedio de capturas (**0,46 chicharritas por trampa**) fue semejante al registrado en igual periodo del 2025 (**Figura 8**).




Figura 8. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Litoral, correspondiente a los meses de julio, agosto y a la primera quincena de septiembre de 2025 y 2026.

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° (01/09 al 15/09).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, se incrementaron las localidades que no registraron al vector, pasando de un **38% a un 63%** en este último informe (**Figura 9**). En aquellas localidades donde hubo capturas, solo se registraron las categorías de 1 a 4 adultos por trampa (**23%**) y de 5 a 20 adultos por trampa (**14%**), como se detalla en la **Figura 9**. Las mayores capturas de *D. maidis* correspondieron **Eufrasio Loza (Córdoba)**, con **20 adultos por trampa (Tabla Región Centro Norte)**.

Durante la primera quincena de septiembre de 2026 el valor promedio de capturas continuó disminuyendo, pasando de **5,47 chicharritas por trampa** (2º quincena de agosto) a **1,65 adultos/trampa** (1º quincena de septiembre). Si bien los valores se mantuvieron por encima de lo registrado en igual período del 2025, la abundancia del vector se redujo cerca de un 70% durante el período analizado (**Figura 10**).




Figura 10. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Norte, correspondiente a los meses de julio, agosto y a la primera quincena de septiembre de 2025 y 2026.

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° (01/09 al 15/09).

Comentarios Región Centro Sur

De las 107 localidades relevadas, un **99%** no tuvieron detecciones de *D. maidis*, consolidándose la ausencia del vector en esta región (**Figura 11 y Tabla Región Centro Sur**).

Durante la primera quincena de septiembre de 2026 el valor promedio de capturas fue de **0,01 chicharritas por trampa**, nivel semejante a lo registrado durante el 2025 (**Figura 12**).




Figura 12. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Sur, correspondiente a los meses de julio, agosto y a la primera quincena de septiembre de 2025 y 2026.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa. Lecturas 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° (01/09 al 15/09).

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	48° Lectura	49° Lectura	50° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	0	0	0
2	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	0	0	0
3	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	0	0	0
4	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	0	0	0
5	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	0	0	0

Comentarios Uruguay

Durante el período evaluado, no se registró presencia de *D. maidis* en ninguna de las cinco localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay. Este escenario resulta concordante con la marcada retracción poblacional observada en las restantes zonas de estudio.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 15 de septiembre de 2026. Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				48° Lectura	49° Lectura	50° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	0	0	5
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	5	2	sin datos
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	10	4	7
4	INTA	Jujuy	El Bananal	Perdida	143	3
5	INTA	Jujuy	Viñalito	228	19	8
6	AAPPCE	Salta	Agua Sucia	84	sin datos	sin datos
7	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	58	16	sin datos
8	AAPRESID	Salta	Rivadavia	0	1	3
9	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	182	25	6
10	CREA	Salta	Antilla	sin datos	sin datos	0
11	CREA	Salta	Copo Quiles	28	sin datos	13
12	CREA	Salta	El Galpón	648	51	39
13	CREA	Salta	El Tunal	sin datos	sin datos	18
14	CREA	Salta	Las Lajitas T3	691	122	6
15	CREA	Salta	Metan 1	21	5	2
16	CREA	Salta	Metan 2	454	18	26
17	CREA	Salta	Mosconi	10	3	1
18	INTA	Salta	Metán	408	400	31
19	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	242	15	12
20	CREA	Tucumán	Alto Verde	8	1	2
21	CREA	Tucumán	Burruyacu	550	7	4
22	CREA	Tucumán	Garmendia	30	14	3
23	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	10	11	401
24	CREA	Tucumán	La Bajada	5	5	2
25	CREA	Tucumán	La Cocha 1	62	26	18
26	CREA	Tucumán	La Cruz	321	6	0
27	CREA	Tucumán	La Invernada	64	16	7
28	CREA	Tucumán	La Virginia	93	38	14
29	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	617	97	sin datos
30	CREA	Tucumán	Las Cejas	1640	495	22
31	CREA	Tucumán	Los Pereyra	18	sin datos	12
32	CREA	Tucumán	Los Puestos	230	10	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

33	CREA	Tucumán	Piedrabuena	103	33	18
34	CREA	Tucumán	Rapelli	420	73	10
35	CREA	Tucumán	Río Colorado	6	1	0
36	CREA	Tucumán	Rumi Punco	39	12	6
37	CREA	Tucumán	San Agustín	177	39	8
38	CREA	Tucumán	Tacanas	178	63	9
39	CREA	Tucumán	Taco Ralo	21	17	6
40	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	177	23	14
41	CREA	Tucumán	Viclos	64	Perdida	1
42	INTA	Tucumán	Leales	0	Perdida	0
43	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	30	20	10
44	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	73	45	19
45	CREA	Santiago del Estero	El Charco	166	sin datos	sin datos
46	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	125	154	2
47	CREA	Santiago del Estero	Frias	93	5	1
48	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	22	4	0
49	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	84	89	5
50	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	480	115	40
51	CREA	Santiago del Estero	Vinará	86	sin datos	sin datos
52	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	Perdida	Perdida	sin datos
53	CREA	Catamarca	El Abra	247	47	4
54	CREA	Catamarca	Los Altos	313	59	50
55	CREA	Catamarca	Frías	sin datos	19	5
56	INTA	Catamarca	Los Altos	3	2	0

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 15 de septiembre de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				48° Lectura	49° Lectura	50° Lectura
1	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	sin datos	11	1
2	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	Perdida	6	1
3	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	Perdida	0	1
4	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	sin datos	15	0
5	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	12	2	4
6	CREA	Santiago del Estero	Puna	17	1	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

7	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	11	10	10
8	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	Perdida	24	9
9	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	147	13	25
10	CREA	Santiago del Estero	Otumpa	7	0	5
11	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	8	2	1
12	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	130	sin datos	sin datos
13	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	220	sin datos	sin datos
14	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	22	3	0
15	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	sin datos	sin datos	0
16	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	49	sin datos	1
17	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	26	10	15
18	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	7	0	1
19	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	84	Perdida	Perdida
20	INTA	Santiago del Estero	Malbran	0	1	0
21	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	59	8	3
22	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	300	20	sin datos
23	CREA	Santiago del Estero	Girardet	300	100	Perdida
24	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	400	100	Perdida
25	CREA	Santiago del Estero	El colorado	400	Perdida	sin datos
26	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	29	3	3
27	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	49	7	2
28	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	63	2	0
29	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	58	sin datos	sin datos
30	AAPPCE	Santiago del Estero	La Victoria	6	1	1
31	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	20	sin datos	sin datos
32	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	sin datos	101	47
33	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	0	0	0
34	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	43	sin datos	sin datos
35	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	4	0	0
36	INTA	Chaco	Tres Isletas	15	4	11
37	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	525	612	45
38	INTA	Chaco	Las Breñas	28	1	0
39	INTA	Chaco	Juan José Castelli	28	2	2
40	INTA	Chaco	Sylvina	0	0	0
41	INTA	Chaco	Saenz peña		2	5
42	INTA	Chaco	Basail	25	10	1
43	CREA	Chaco	San Bernardo	0	0	0
44	CREA	Chaco	La Montenegrina	1	3	0
45	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	1	7	0
46	CREA	Chaco	Palo blanco	5	1	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

47	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	55	9	0
48	CREA	Chaco	Castelli	24	2	1
49	CREA	Chaco	Bajo Hondo	3	5	4
50	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	3	1	0
51	CREA	Chaco	Charata	250	Perdida	0
52	CREA	Chaco	Gancedo	500	5	1
53	CREA	Chaco	Las Breñas	Perdida	Perdida	0
54	CREA	Chaco	Las Piedras	0	sin datos	sin datos
55	INTA	Formosa	El colorado	63	3	0
56	INTA	Formosa	Comandante Fontana	208	124	119
57	CREA	Formosa	Perin	sin datos	60	1
58	CREA	Formosa	Las Lomitas	sin datos	0	10
59	CREA	Santa Fe	La María	0	0	0
60	CREA	Santa Fe	Margarita	sin datos	0	sin datos
61	CREA	Santa Fe	Ramayón	1	0	0
62	CREA	Santa Fe	Soledad	4	0	2
63	CREA	Santa Fe	Hersilia	8	sin datos	3
64	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	0	1	0
65	CREA	Santa Fe	La Osca	7	6	2
66	CREA	Santa Fe	Malabrigo	12	3	3
67	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	0	0	0
68	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	4	0	0
69	AAPPCE	Santa Fe	Santa Margarita	16	6	0
70	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	sin datos	5	sin datos
71	INTA	Santa Fe	Reconquista	11	1	0
72	INTA	Santa Fe	Calchaquí	11	4	11
73	INTA	Santa Fe	Logroño	2	1	1
74	INTA	Santa Fe	San javier	0	11	1
75	INTA	Santa Fe	La sarita	7	2	2
76	CREA	Santa Fe	Emilia	0	0	0
77	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	1	0	0
78	CREA	Santa Fe	La Pelada	0	0	1
79	CREA	Santa Fe	Crespo	0	0	0
80	CREA	Santa Fe	Colonia Esther	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 15 de septiembre de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	48° Lectura	49° Lectura	50° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	Perdida	1	1
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	10	4	0
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	16	0	0
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	13	7	8
5	INTA	Corrientes	Estancia el Rocío Copra	13	2	3
6	INTA	Corrientes	Mercedes	16	5	4
7	INTA	Corrientes	Virasoro	3	0	0
8	INTA	Corrientes	Goya	0	1	0
9	INTA	Corrientes	Curuzú	0	0	0
10	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	0
11	INTA	Corrientes	Monte Caseros	14	3	1
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	3	0	0
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	0	0	0
14	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	1	sin datos	0
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	1	1	0
16	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	0	0	0
17	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	0	0	0
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	0	0	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	0	0	0
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	0	0	0
22	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	0
23	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	Perdida	1	0
24	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	0	0	0
25	CREA	Entre Ríos	La Paz	1	0	0
26	CREA	Entre Ríos	Feliciano	0	0	sin datos
27	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	Perdida	0	0
28	CREA	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0
29	CREA	Entre Ríos	Gualedguaychu	0	0	0
30	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	0	0
31	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	1	1	sin datos
32	INTA	Entre Ríos	Maria Grande	0	1	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

33	INTA	Entre Ríos	Nogoya	0	0	0
34	INTA	Entre Ríos	Villaguay	0	0	0
35	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	0	0	0
36	INTA	Entre Ríos	Diamante	0	0	0
37	INTA	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0
38	INTA	Entre Ríos	Parana	1	1	0
39	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	0	0	0
40	INTA	Misiones	Montecarlo		157	67

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 15 de septiembre de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				48° Lectura	49° Lectura	50° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	Perdida	0	0
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	1	0	0
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	4	3	2
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	3	1	0
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	127	27	1
6	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	29	5	1
7	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	0
8	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	sin datos	6	0
9	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	155	28	5
10	AAPRESID	Córdoba	Devoto	3	1	0
11	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	sin datos	0	sin datos
12	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	590	57	20
13	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	Perdida	0	sin datos
14	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	76	2	2
15	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	sin datos	2	0
16	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	57	7	4
17	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	0	4	0
18	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	32	3	sin datos
19	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	sin datos	0	0
20	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	60	20	0
21	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	sin datos	sin datos	Perdida
22	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	27	2	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

23	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	sin datos	20	9
24	CREA	Córdoba	Piquillín	1	3	0
25	CREA	Córdoba	Las Chilcas	251	Perdida	8
26	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	5	0	1
27	CREA	Córdoba	El Tío	44	5	11
28	CREA	Córdoba	Las Astillas	sin datos	28	9
29	CREA	Córdoba	Tala Norte	39	1	1
30	CREA	Córdoba	Mi Granja	12	3	1
31	CREA	Córdoba	Sacanta	0	1	1
32	CREA	Córdoba	Sinsacate	4	0	sin datos
33	INTA	Córdoba	Manfredi	16	0	0
34	INTA	Córdoba	San Francisco	Perdida	12	0
35	INTA	Córdoba	Brinkmann	23	5	0
36	AAPRESID	San Luis	La Toma	5	0	0
37	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	16	4	0
38	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	3	Perdida	1
39	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	Perdida	1	0
40	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	0	0	0
41	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	1	1	0
42	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	Perdida	22	4
43	AAPPCE	Santa Fe	Pilar	Perdida	3	0
44	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	35	65	11
45	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	sin datos	0
46	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	2	sin datos	0
47	AAPPCE	Santa Fe	Vila	Perdida	3	1
48	AAPPCE	Santa Fe	López	2	4	0
49	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	6	5	0
50	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	1	0	0
51	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	0	0	sin datos
52	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	2	0	1
53	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	0	0	0
54	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	0	4	5
55	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	0	2	0
56	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	5	2	0
57	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	2	0	sin datos
58	AAPRESID	Santa Fe	San Bernardo	sin datos	1	sin datos
59	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	3	3	1
60	CREA	Santa Fe	Ataliva	0	0	0
61	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	0	0	0
62	CREA	Santa Fe	Crispi	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

63	CREA	Santa Fe	Esperanza	0	2	0
64	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	Perdida	sin datos	sin datos
65	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	0	0	0
66	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	0	0	0
67	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	0	0	2
68	CREA	Santa Fe	San Fabián	0	0	0
69	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	6	0	0
70	CREA	Santa Fe	Clucellas	0	1	0
71	INTA	Santa Fe	Centeno	0	1	0
72	INTA	Santa Fe	Rafaela	5	2	0
73	INTA	Santa Fe	Ceres	2	0	0
74	INTA	Santa Fe	San Justo	Perdida	0	5

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 48° (01/08 al 17/08), 49° (18/08 al 31/08) y 50° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 al 15 de septiembre de 2026. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				48° Lectura	49° Lectura	50° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	1	0	0
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	0	0
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	0	0	0
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	sin datos	0
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	Perdida	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Rafael Obligado	0	sin datos	sin datos
17	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	0	0
18	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

19	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
20	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	0	0	Perdida
21	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	sin datos	0	0
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
24	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	sin datos	0
25	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
28	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	Perdida	0
31	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0
32	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	sin datos	0	0
33	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	0	0
34	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	Perdida	sin datos	sin datos
35	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	sin datos
36	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	0
37	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	0	0
38	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
39	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0
40	CREA	Buenos Aires	Casey	0	sin datos	sin datos
41	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	Perdida
42	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
43	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	sin datos	0	0
44	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	sin datos	0	0
45	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
46	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
47	CREA	Buenos Aires	San Pedro	0	0	1
48	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
50	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
51	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0
52	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	Perdida	0	0
53	INTA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
54	INTA	Buenos Aires	Conesa	2	0	0
55	INTA	Buenos Aires	San Antonio de Areco	0	0	0
56	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
57	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

58	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0
59	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
60	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
61	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	Perdida
62	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	0	0
63	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	0	0
64	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	0	0	0
65	AAPPCE	Córdoba	La playosa	0	0	0
66	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	0	0
67	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	0	0	0
68	AAPPCE	Córdoba	Villa María	0	0	0
69	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	0	0	0
70	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
71	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	2	0	0
72	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	0
73	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	1	0
74	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
75	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	0	0	0
76	AAPRESID	Córdoba	Pegasano	0	3	0
77	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	1	2	0
78	CREA	Córdoba	General Levalle	0	0	0
79	CREA	Córdoba	La Carlota	2	0	0
80	CREA	Córdoba	Melo	0	0	0
81	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	1	0	0
82	CREA	Córdoba	Villa valeria	0	0	0
83	CREA	Córdoba	Monte Buey	sin datos	0	0
84	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	0	0	0
85	CREA	Córdoba	Ballesteros	sin datos	3	0
86	CREA	Córdoba	La Brianza	0	0	0
87	AAPPCE	Córdoba	Achiras	0	0	0
88	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
89	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	0
90	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
91	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	0
92	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0
93	AAPPCE	La Pampa	Winifreda	0	0	sin datos
94	AAPPCE	La Pampa	Ing. Luiggi	0	0	0
95	AAPRESID	San Luís	La Angelina	sin datos	0	0
96	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	0
97	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

98	CREA	San Luís	Juan Jorba	0	0	sin datos
99	INTA	San Luís	San Luis 1	0	0	0
100	CREA	San Luís	Naschel	3	0	0
101	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	sin datos	sin datos	0
102	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	0	0
103	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
104	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	0	0	Perdida
105	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	1	1	0
106	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	1	0
107	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	4	2	0
108	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	0
109	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	0	0	0
110	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	0	0
111	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	0	0	0
112	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	Perdida	0	0
113	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	Perdida
114	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	0	0	0
115	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	0	0	0
116	INTA	Santa Fe	Pujato	1	Perdida	0
117	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	0	0	0
118	AAPPCE	Santa Fe	Los Quirquinchos	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.