
Situación actual de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) en los sistemas productivos del NOA

Plan de estudio sobre la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) Proyecto EEAOC – CREA Región NOA

Se presentan los resultados del monitoreo de *Dalbulus maidis* en tres localidades del NOA durante la segunda mitad de octubre y la primera quincena de noviembre de **2026**, en comparación con el mismo período de **2024** y **2025**. Se utilizaron trampas cromáticas adhesivas en trigo en San Agustín, en maíz primaveral en Los Altos y en barbecho en Isca Yacu. El monitoreo se complementó con evaluaciones de adultos en maíz guacho durante noviembre en San Agustín, en maíz primaveral en Los Altos y en malezas en Isca Yacu, según la disponibilidad de maíz guacho.

San Agustín – Cruz Alta – Tucumán


En las dos primeras semanas de noviembre de **2026** se registraron, respectivamente, 1 y 0,5 adultos de *D. maidis* por trampa cromática adhesiva (Figura 1).



	2024	2025	2026
3° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
4° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
1° Semana de noviembre	0,3	0,0	1,0
2° Semana de noviembre	0,5	0,0	0,5

Figura 1. Promedio de adultos de *Dalbulus maidis* por trampa cromática adhesiva en San Agustín, Cruz Alta, Tucumán, durante octubre y noviembre de 2024, 2025 y 2026. Las trampas se instalaron en trigo.

Desde la primera semana de noviembre de **2026**, el monitoreo se realizó en plantas de maíz guacho. Se registraron 0,3 y 0,2 adultos cada 10 plantas en la primera y segunda semana, respectivamente. En las mismas semanas de **2025**, no se detectó presencia de adultos (Figura 2).




	2024	2025	2026
3° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
4° Semana de octubre	0,1	0,3	0,0
1° Semana de noviembre	0,1	0,0	0,3
2° Semana de noviembre	0,0	0,0	0,2

Figura 2. Promedio de adultos de *Dalbulus maidis* por punto de monitoreo en San Agustín, Cruz Alta, Tucumán, durante octubre y noviembre de 2024, 2025 y 2026. En octubre se utilizó una red entomológica sobre trigo. Los registros de noviembre de 2025 y 2026 corresponden a adultos cada 10 plantas de maíz guacho.

Los Altos – Santa Rosa - Catamarca

Durante el período evaluado se realizaron aplicaciones de insecticidas dirigidas al control de *D. maidis* en el lote de monitoreo. Este manejo debe considerarse al interpretar las capturas en trampas y la abundancia de adultos sobre el cultivo.


Las trampas instaladas en maíz primaveral registraron 1,5 y 1 adulto por trampa en la primera y segunda semana de noviembre de **2026**, respectivamente, frente a 1 adulto por trampa en la última semana de octubre. Las capturas fueron inferiores a las de las semanas correspondientes de **2025** (Figura 3).



	2024	2025	2026
3° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
4° Semana de octubre	0,0	1,0	1,0
1° Semana de noviembre	0,0	2,3	1,5
2° Semana de noviembre	0,0	1,3	1,0

Figura 3. Promedio de adultos de *Dalbulus maidis* por trampa cromática adhesiva en Los Altos, Santa Rosa, Catamarca, durante octubre y noviembre de 2024, 2025 y 2026. Las trampas se instalaron en maíz primaveral.

En maíz primaveral, durante la primera y segunda semana de noviembre de **2026**, se registraron valores que oscilaron de 0 y 0,05 adultos cada 10 plantas respectivamente. Ambos valores fueron inferiores a los de las semanas correspondientes de **2025** (Figura 4).




	2024	2025	2026
3° Semana de octubre	0,00	0,90	0,05
4° Semana de octubre	0,00	0,70	0,00
1° Semana de noviembre	0,00	1,00	0,00
2° Semana de noviembre	0,00	0,10	0,05

Figura 4. Promedio de adultos de *Dalbulus maidis* cada 10 plantas de maíz en Los Altos, Santa Rosa, Catamarca, durante octubre y noviembre de 2024, 2025 y 2026.

Isca Yacu – Jiménez – Santiago del Estero


Se registraron capturas en trampas cromáticas adhesivas durante las dos primeras semanas de noviembre de **2026**, en valores semejantes a los observados en igual periodo de **2025** (Figura 5).



	2024	2025	2026
3° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
4° Semana de octubre	0,3	0,0	1,0
1° Semana de noviembre	0,0	0,3	0,3
2° Semana de noviembre	0,0	0,3	0,8

Figura 5. Promedio de adultos de *Dalbulus maidis* por trampa cromática adhesiva en Isca Yacu, Jiménez, Santiago del Estero, durante octubre y noviembre de 2024, 2025 y 2026. Las trampas se instalaron en barbecho de maíz.

Ante la ausencia de maíz guacho desde la cuarta semana de octubre de **2026**, el monitoreo se realizó con red sobre malezas, detectándose adultos en la segunda de noviembre (Figura 6).



	2024	2025	2026
3° Semana de octubre	0,0	0,3	0,0
4° Semana de octubre	0,0	0,1	0,2
1° Semana de noviembre	0,0	0,0	0,0
2° Semana de noviembre	0,0	0,0	0,2

Figura 6. Adultos de *Dalbulus maidis* por punto de monitoreo en Isca Yacu, Jiménez, Santiago del Estero, durante octubre y noviembre de 2024, 2025 y 2026. Se usó red sobre malezas en 2024 y desde la cuarta semana de octubre de 2026. Los demás registros corresponden a adultos cada 10 plantas de maíz guacho.

Consideraciones finales

- En **San Agustín**, durante la primera quincena de noviembre de **2026** se observaron bajos niveles de adultos en trampas y sobre maíz guacho. En el mismo periodo del **2025**, no se registraron adultos en esta localidad.

- En **Los Altos**, las capturas en trampas y los monitoreos sobre maíz primaveral en **2026** fueron inferiores a los de la primera quincena de noviembre de **2025**. La comparación debe interpretarse teniendo en cuenta las aplicaciones de insecticidas en el lote monitoreado durante el 2026.

- En **Isca Yacu**, las capturas de la segunda semana de noviembre fueron mayores en **2026** que en **2025** (0,8 frente a 0,3 adultos por trampa). Por otra parte, si bien las evaluaciones sobre el lote en ambos años no tuvieron niveles de presencia elevados, se realizaron con métodos distintos durante la quincena, lo que limita su comparación.

Durante la **primera quincena de noviembre de 2026**, la abundancia de adultos de *D. maidis* fue baja en las tres localidades, con variaciones interanuales según el sitio y el método de monitoreo. La detección de adultos al inicio de noviembre justifica sostener el monitoreo y controlar oportunamente el maíz guacho durante la transición hacia la próxima campaña.