
Situación actual de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) en los sistemas productivos del NOA

Plan de estudio sobre la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) Proyecto EEAOC – CREA Región NOA

Se presentan los resultados del monitoreo de *Dalbulus maidis* en localidades del NOA durante el mes de octubre de **2026**, comparados con igual período de **2024** y **2025**. Se utilizaron trampas cromáticas adhesivas instaladas sobre trigo en San Agustín, maíz primaveral en Los Altos y barbecho, con presencia de maíces guachos, en Isca Yacu. Además, se evaluaron adultos con red entomológica sobre trigo en San Agustín y mediante observación de plantas de maíz en Los Altos y maíz guacho en Isca Yacu. En esta última localidad, el monitoreo de la cuarta semana de octubre de 2026 se efectuó sobre malezas, debido a la ausencia de maíz guacho.

San Agustín – Cruz Alta – Tucumán


En trampas cromáticas, durante **2026** no se registró captura de adultos en los monitoreos correspondientes al mes de octubre, coincidiendo con los valores registrados en **2025** (Figura 1).



	2024	2025	2026
1° Semana de octubre	0,3	0,0	0,0
2° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
3° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
4° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0

Figura 1. Número promedio de adultos de *Dalbulus maidis* capturados por trampa cromática adhesiva correspondiente a la localidad de San Agustín, Cruz Alta, Tucumán. Comparación de octubre de 2024/25/26. Los datos corresponden a trampas colocadas sobre cultivo de trigo.

Sobre trigo, tampoco se registró presencia de adultos de *D. maidis* desde la primera semana de octubre de **2026**. En **2025**, no se registraron adultos durante las primeras tres semanas, mientras que en la cuarta se observó un promedio de 0,3 adultos por punto de monitoreo (Figura 2).




	2024	2025	2026
1° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
2° Semana de octubre	0,1	0,0	0,0
3° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
4° Semana de octubre	0,1	0,3	0,0

Figura 2. Promedio de adultos de *Dalbulus maidis* por punto de monitoreo correspondiente a la localidad de San Agustín, Cruz Alta, Tucumán. Comparación de octubre de 2024/25/26. Las evaluaciones corresponden a la cantidad de adultos por punto de monitoreo con red entomológica sobre trigo.

Los Altos – Santa Rosa - Catamarca

Durante el periodo evaluado, actualmente en el lote de monitoreo se están realizando aplicaciones de insecticidas dirigidas al control de *D. maidis*. Este manejo continuo incide en la dinámica de adultos registrada tanto en trampas como sobre el cultivo y debe considerarse al interpretar las variaciones observadas.


En trampas cromáticas adhesivas sobre maíz primaveral, si bien durante la primera semana de octubre de **2026** se registraron 4 adultos por trampa, no se detectaron capturas en la segunda y tercera semana, mientras que en la cuarta se registró 1 adulto por trampa, igual al valor observado en esa semana de **2025** (Figura 3).



	2024	2025	2026
1° Semana de octubre	0,0	0,0	4,0
2° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
3° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
4° Semana de octubre	0,0	1,0	1,0

Figura 3. Número promedio de adultos de *Dalbulus maidis* capturados por trampa cromática adhesiva correspondiente a la localidad de Los Altos, Santa Rosa, Catamarca. Comparación de octubre de 2024/25/26. Los datos corresponden a trampas colocadas sobre el cultivo de maíz.

Sobre maíz, en **2026** la abundancia se mantuvo en 0,05 adultos cada 10 plantas (equivalente a 1 adulto cada 200 plantas), durante las primeras tres semanas de octubre, sin detectarse adultos en la cuarta. Los valores fueron inferiores a los registrados en las semanas correspondientes de **2025**, que oscilaron entre 0,15 y 0,90 adultos cada 10 plantas (entre 3 y 18 adultos cada 200 plantas, respectivamente) (Figura 4).




	2024	2025	2026
1° Semana de octubre	0,00	0,25	0,05
2° Semana de octubre	0,00	0,15	0,05
3° Semana de octubre	0,00	0,90	0,05
4° Semana de octubre	0,00	0,70	0,00

Figura 4. Promedio de adultos de *Dalbulus maidis* por punto de monitoreo correspondiente a la localidad de Los Altos, Santa Rosa, Catamarca. Comparación de octubre de 2024/25/26. Las evaluaciones corresponden al promedio de adultos en 10 plantas de maíz.

Isca Yacu – Jiménez – Santiago del Estero


Durante las primeras tres semanas de octubre de **2026** no se registraron capturas en trampas cromáticas adhesivas, al igual que en **2024** y **2025**. En la cuarta semana se registró un promedio de 1 adulto por trampa, frente a 0,3 en 2024 y ausencia de capturas en 2025 (Figura 5).



	2024	2025	2026
1° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
2° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
3° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
4° Semana de octubre	0,3	0,0	1,0

Figura 5. Número promedio de adultos de *Dalbulus maidis* capturados por trampa cromática adhesiva correspondiente a la localidad de Isca Yacu, Jiménez, Santiago del Estero. Comparación de octubre de 2024/25/26. Los datos corresponden a trampas colocadas sobre barbecho de maíz.

Las evaluaciones de **2024** se realizaron con red entomológica sobre malezas, mientras que las de **2025** y las primeras tres semanas de octubre de **2026** se efectuaron sobre plantas de maíz guacho. En estas últimas no se detectaron adultos. En la cuarta semana de octubre de 2026, el monitoreo se realizó sobre malezas debido a la ausencia de maíz guacho y se registró presencia de adultos, con un promedio levemente superior al observado en el mismo periodo de **2025**. (Figura 6).



	2024	2025	2026
1° Semana de octubre	0,0	0,0	0,0
2° Semana de octubre	0,2	0,0	0,0
3° Semana de octubre	0,0	0,3	0,0
4° Semana de octubre	0,0	0,1	0,2

Figura 6. Promedio de adultos de *Dalbulus maidis* por punto de monitoreo correspondiente a la localidad de Isca Yacu, Santiago del Estero. Comparación de octubre de 2024/25/26. Las evaluaciones de 2024 y la cuarta semana de octubre de 2026 corresponden a adultos por punto de monitoreo con red sobre malezas. Las demás evaluaciones corresponden al promedio de adultos en 10 plantas de maíz guacho.

Consideraciones finales

✓ En **San Agustín**, durante octubre de **2026** no se detectaron adultos en trampas ni en los muestreos con red entomológica sobre trigo. La ausencia de capturas en trampas y sobre el cultivo invernal coincidió en gran parte con lo observado en **2025**. A partir del mes de noviembre se incorporarán monitoreos sobre maíz guacho para esta localidad.

✓ En **Los Altos**, las capturas en trampas durante octubre de **2026** se concentraron en la primera y cuarta semana. Sobre maíz, la abundancia fue inferior a la registrada en **2025** durante todo el mes, sin detectarse adultos en la última evaluación.

✓ En **Isca Yacu**, durante **2026** solo se detectaron adultos en la cuarta semana de octubre, tanto en trampas como en el monitoreo sobre malezas.

Durante **octubre de 2026** se registraron bajos niveles de *Dalbulus maidis* en las tres localidades, aunque con variaciones entre semanas, sin presentar diferencias considerables con respecto al mismo período de **2025**. Sin embargo, la detección de presencia de adultos al cierre del mes en Los Altos e Isca Yacu justifica mantener el seguimiento poblacional y el control oportuno durante la transición hacia la próxima campaña.